

Notă: Informația va fi constant reactualizată pe măsura avansării cercetărilor.

Sumar SCHEMĂ al recomandărilor practice în managementul pacientului cu ARDS asociat infecției COVID-19.

COVID-19 cu ARDS forma ușoară 200 < PaO ₂ / FiO ₂ < 300mm Hg	COVID-19 cu ARDS moderat (100 < PaO ₂ / FiO ₂ < 200 mm Hg) sau sever (PaO ₂ / FiO ₂ < 100mm Hg)	Terapii adjuvante
Da: Vt 4-8 ml/ kg P plat < 30 cm H ₂ O	(!?) Optați: Creșteți PEEP	(???) Fără evidențe: Antivirale, Clorochină, anti Il-6
Da: Investigați pentru o infecție bacteriană	(!?) Optați: Bolusuri de miorelaxante pentru a facilita atingerea parametrilor ventilatori-țintă	(!?) Optați: în caz de poziție „pronă”, P plat înalt, desincronizare Perfuzie continuă cu miorelaxante
Da: SpO ₂ țintă 92 - 96%	(!?) Optați: dacă pacientul e responsiv la PEEP Manevre clasice de recrutare	(!?) Optați: Ventilare în poziție „pronă” ≥ 12 - 16 ore
(!?) Optați: Strategie de perfuzie conservativă	(!?) Optați: Ventilare în poziție „pronă” ≥ 12 - 16 ore	(!?) Optați: întrerupeți în cazul în care nu obțineți o ameliorare rapidă Oxid nitric inhalator
(!?) Optați: Antibioticoterapie empirică	(!?) Optați: în caz de poziție „pronă”, P plat înalt, desincronizare Perfuzie continuă cu miorelaxante	(!?) Optați: evaluați prezența criteriilor pentru ECMO Transfer la un centru ECMO
(???) Fără evidențe: Corticoterapie	(!) NU: Recrutarea în trepte cu creșterea gradată a PEEP-lui	
	(!?) Optați: Corticoterapie de scurtă durată	
		(???) Fără evidențe: Antivirale, Clorochină, anti Il-6

Notă: Informația va fi constant reactualizată pe măsura avansării cercetărilor.